




Eutergesundheitsmonitoring

Kennzahl
milch **Q** plus

Erstlaktierendenmastitisrate beim Anmelken

- Die Häufigkeit von Euterentzündungen bei Erstlaktierenden nimmt zu. Häufig wird die Erkrankung erst beim Anmelken oder in den ersten Wochen der Laktation bemerkt, obwohl die Infektion schon länger besteht.

Die Eutergesundheit von Erstlaktierenden ist häufig schon beim Anmelken gestört.



Erstlaktierendenmastitisrate

Der Anteil der Erstlaktierenden mit > 100.000 Zellen/ml bei der ersten MLP nach der Abkalbung.

INFO

Maßnahmen zur Minimierung der Erstlaktierendenmastitisrate

- hygienischere Haltungsbedingungen
- kürzere Nachstreuintervalle
- erfolgreiche Fliegenbekämpfung
- Trennung von Trockenstehern und tragenden Rindern
- Vermeidung von Überbelegung
- Entfernen von ansaugenden Tieren

MERKE

Erstlaktierendenmastitisrate auf Betriebsebene:

Spitzenbetrieb: <15 %
Durchschnittlicher Betrieb: 40 %

Auch das Anmelken von Tieren vor der ersten Kalbung, wenn sie bereits die Milch laufen lassen, kann zu einer Verringerung der Erstlaktierendenmastitisrate führen!